



SIGNUM

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS (kg/ha)	N.º Aplicaciones máx.	Intervalo entre aplicaciones (días)	PLAZO DE SEGURIDAD (días)
Tomate, Pimiento y Berenjena (AL e INV)	Botritis, Esclerotinia, Oídio	0,1-0,15% Dosis máx: 1,5 kg/ha	3	7-10	3
Fresas (invernadero)	Botritis, Oídio	0,15	2	7-10	3
Lechuga (AL)	Botritis, Esclerotinia	1-1,18 kg/ha	2	7-10	7
Almendro (AL)	Abolladura, Cribado, Monilia	1-1,5 kg/ha	2	10-15	28
Avellano y Nuez (AL)	Necrosis gris	1 kg/ha	2	10-15	28
Brécol (AL)	Alternaria	1 kg/ha	3	7-10	14
Ajo (AL)	Botritis, Roya	1 kg/ha	2	7-10	14
Cebolla (AL)	Botritis, Esclerotinia	1-1,5 kg/ha	2	7-10	14
Frambuesa, Mora, Arándano, Mirtilo y Grosella (AL)	Botritis, Oídio	1-1,5 kg/ha	2	7-10	3
Espárrago (AL)	Podredumbre blanca, Roya	1-1,5 kg/ha	2	10	n/p
Judías sin vaina (AL)	Botritis, Esclerotinia, Roya	1-1,5 kg/ha	2	10	10
Escarola (AL)	Botritis, Esclerotinia	1-1,5 kg/ha	2	7-10	14
Puerro (AL)	Botritis, Mildiu	1-1,5 kg/ha	2	7-14	21
Garbanzo (AL)	Esclerotinia, Rabia del guisante	1-1,5 kg/ha	2	10	7
Espinaca (AL)	Antracnosis, Cladosporiosis, Mildiu	1 kg/ha	2	7-10	14
Zanahoria (AL)	Alternaria, Oídio	1 kg/ha	2	7-10	14
Ornamentales herbáceas y leñosas (AL e INV)	Oídio, Botritis	1-1,5 kg/ha	2	10	n/p
Alcachofa	Botritis, Mildiu	1 kg/ha	2	7-10	14
Apio	Mildiu	1-1,5 kg/ha	2	10	14
Brotos tiernos, incluidas las especies de Brassicas	Botritis, Esclerotinia	1-1,5 kg/ha	2	7	14
Coliflor	Alternaria	1 kg/ha	3	7-10	14
Hierbas aromáticas y flores comestibles	Botritis, Esclerotinia	1-1,5 kg/ha	2	10	14

Pistachero (AL)	Botriosfera, Abolladura, Cribado, Monilia	1 kg/ha	2	10-15	28
Apio (AL)	Botritis, Mildiu	1-1,5 kg/ha	2	10	21