



## POLYRAM DF

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS %	DOSIS (kg/ha)	PLAZO DE SEGURIDAD (días)
Cucurbitáceas de piel comestible (aire libre e invernadero)	Mildiu	0,15-0,2	1,5-2	3
Cucurbitáceas de piel no comestible (aire libre)	Mildiu	0,15-0,2	1,5-2	3
Vid	Mildiu, Excoriosis y podredumbre negra	0,15-0,2	0,8	56
Lechuga	Mildiu	0,15-0,2	1,5-1,6	14
Escarola	Mildiu y Roya	0,15-0,2	1,5-1,6	14
Frutales de pepita	Monilia, Moteado,	0,15-0,2	1,5-2	21
Tomate (aire libre e invernadero)	Alteraria, Antracnosis, Mildiu y Septoria	0,15-0,2	1,5-2	7
Ornamentales herbáceas (aire libre e invernadero)	Mildiu y Roya	0,15-0,2	1,5-2	n/p
Arbustos ornamentales (aire libre e invernadero)	Alternaria, Mildiu y Roya	0,15-0,2	1,5-2	n/p
Patata	Alteraria, Antracnosis, Mildiu y Septoria	0,15-0,2	1,5-2	14
Berejena (aire libre e invernadero)	Alteraria, Antracnosis, Mildiu y Septoria	0,15-0,2	1,5-2	7